Encontro de Saberes 2017 - XXV Seminário de Iniciação Científica

Education Against Tobacco (EAT): avaliação do perfil de tabagismo em estudantes de 12-17 anos – antes, 6 e 12 meses após a realização de intervenções educativas padronizadas

OSCAR CAMPOS LISBOA (Autor), Paulo Cesar Rodrigues Pinto Correa (Orientador), Breno Bernardes de Souza (Co-Autor), Luiz Eduardo de Freitas Xavier (Co-Autor), Matheus Rocha Almeida (Co-Autor)

Instituição de Ensino - Universidade Federal de Ouro Preto

Palavras Chaves:

estudantes de medicina, prevenção do tabagismo, escolas secundárias, cessação do tabagismo, adolescentes, prevenção baseada em escolas

Resumo:

Introdução: O tabagismo é a principal causa prevenível de morbidade e mortalidade no Brasil. Education Against Tobacco (EAT) é uma rede internacional, apoiada pela Harvard Medical School, que envolve mais de 1500 estudantes de medicina em 13 países que se voluntariam a realizar ações educativas inovadoras com adolescentes escolares para a prevenção do tabagismo. Um recente estudo do EAT na Alemanha mostrou efeitos significativos das intervenções na cessação do tabagismo entre adolescentes em um seguimento de curto prazo. O objetivo desse estudo é avaliar a efetividade a longo prazo das intervenções do EAT na redução da prevalência do tabagismo entre adolescentes de escolas do Brasil. Métodos e análise: Um estudo randomizado controlado será conduzido em aproximadamente 1500 adolescentes da sexta série do ensino fundamental ao segundo ano do ensino médio (12 a 17 anos) de escolas brasileiras. O desenho do estudo experimental inclui medidas iniciais, 6 meses e 12 meses após a intervenção. Os grupos de estudo consistirão de turmas randomizadas que receberão uma intervenção padronizada do EAT (90 minutos de intervenção em sala de aula) e turmas-controle dentro das mesmas escolas (sem intervenção). O questionário do estudo que avalia se o indivíduo é ou não fumante, gênero, aspectos sociais e culturais utiliza itens previamente testados e originados de questionários já publicados. O desfecho primário desse estudo é a diferença entre os dois grupos (controle e intervenção) no que diz respeito a suas respectivas mudanças de prevalência de tabagismo após 12 meses de seguimento. Resultados: o projeto encontra-se na fase de planejamento do follow-up de 12 meses. De acordo com o protocolo do estudo, o qual já foi publicado como artigo-protocolo em uma revista internacional, revisada por pares e indexada ao PubMed, os resultados só serão divulgados ao final do projeto. Tem-se notado excelente receptividade dos adolescentes ao projeto e as metas de amostragem cumpridas.

Publicado em:

- Evento:Encontro de Saberes 2017
- Área:CIÊNCIAS DA VIDA
- Subárea:MEDICINA

ISSN: 21763410